ENDOCRINOLOGIA

Lezione 4
Tiroide

CORSO DI LAUREA IN SCIENZE OSTETRICHE
Secondo Anno – Secondo Semestre
Medicina Interna – Scienze Chirurgiche – Medicina Prenatale
Assistenza al parto ed al puerperio

Prof. Costanzo Moretti
Dipartimento di Medicina dei Sistemi



www.endocrinologiamoretti.it

Didattica

(a) Patient with a large multinodular goitre

(b) Position of thyroid in neck



(d) Thyroid hormones



(c) Thyroid-hormone synthesis



(e) Metabolism of thyroid hormone



Asse ipotalamo ipofisi tiroide



Anatomia della tiroide



Anatomia della tiroide





Cellula follicolare tiroidea





Thyrotripin Releasing Hormone







Biochimica degli ormoni tiroidei





NELL'ADULTO GLI ORMONI TIROIDEI REGOLANO I PROCESSI METABOLICI ESSENZIALI PER LA NORMALE CRESCITA E SVILUPPO. L'EQUILIBRIO FUNZIONALE TIROIDEO SI CORRELA CON IL PESO CORPOREO E LA SPESA ENERGETICA



NEURONI PARVALBUMINERGICI dell'ipotalamo anteriore sono direttamente legati alla regolazione della funzione cardiovascolare, incluso il battito cardiaco, la pressione arteriosa e la temperatura corporea



NUCLEO PARAVENTRICOLARE
la leptina, prodotta dal tessuto adiposo periferico esercita a questo livello una reazione di feedback e stimola trasduttori ed attivatori della trascrizione (STAT3 e STAT3-P) che direttamente stimolano la espressione di TRH. La leptina inoltre stimola in via indiretta il TRH a livello del nucleo arcuato inibendo il neuropeptide Y e le agouti proteins, stimolando POMC. Il peptide αMSH generato da POMC attiva CREB nei neuroni TRH



NUCLEO VENTROMEDIALE dell'ipotalamo (VMH)
l'ipertiroidismo od il trattamento con T3 stimola *de novo* la sintesi di acidi grassi che inibiscono la fosforilazione di AMPK ed incrementano la attività sintasica degli acidi grassi con conseguente attivazione del tessuto adiposo brown (BAT)



BAT
Il signaling adrenergico attraverso i recettori βadrenergici stimola la espressione del gene *UCP1*, la attività Deiodinasica 2 attraverso deubiquitinazione e promuove termogenesi e perdita di peso



WAT (white adipose tissue)
Segnali del sistema nervoso simpatico via recettori adrenergici β1 e β2 stimolano la lipolisi nel WAT . A questo livello T3 stimola la produzione locale di norepinefrina (NE), incrementa la lipolisi e riduce il grasso

La omeostasi lipidica nel fegato è regolata in modo coordinato dalla azione diretta di T3 e dalla azione indiretta di *cross-talk* con vari recettori nucleari attivati dati nutrienti

HMG-CoA reductasi : un enzima coinvolto nella sintesi del colesterolo

LDL-R low density lipoprotein receptor

CYP7a1 enzyma rate-limiting nella sintesi degli acidi biliari

ACC1 acetil CoA carbossilasi

FAS sintasi acidi grassi

CPT1α trasporta acidi grassi a catena lunga nei mitocondri per la ossidazione





MUSCOLO
Forkhead box O3 induce la espressione di D2, incrementa la disponibilità locale di T3 e promuovendo l'espressione di geni target per T3



PANCREAS

T3 e T3R sono indispensabili per il normale sviluppo e funzione pancreatica. Nel modello murino TR e D2 sono attivati durante le fasi di sviluppo

MAFA : v-maf muscoloaponeurotic fibrosarcoma oncogene homolog A

AZIONE BIOLOGICA DEGLI ORMONI TIROIDEI

TERMOGENESI E PESO CORPOREO

- METABOLISMO BASALE
- TERMOGENESI
- ATTIVITA' DEL MUSCOLO SCHELETRICO
- MANTENIMENTO DI CORRETTO RAPPORTO FAT/LEAN

METABOLISMO LIPIDICO

- REGOLAZIONE DELLA SINTESI DEL COLESTEROLO
- EFFLUX DEL COLESTEROLO
- SINTESI DEGLI ACIDI BILIARI
- METABOLISMO DEGLI ACIDI GRASSI
- STEATOSI EPATICA

METABOLISMO DEI CARBOIDRATI

- GLUCONEOGENESI
- SINTESI ED AZIONE INSULINICA
- CORRELAZIONI TRA STATO TIROIDEO ED INSORGENZA DEL DIABETE

Gli ormoni tiroidei circolano agganciati a proteine di trasporto



AZIONE BIOLOGICA DEGLI ORMONI TIROIDEI



Copyright ©2003 Elsevier Science (USA). All rights reserved.



Copyright ©2003 Elsevier Science (USA). All rights reserved.

In assenza di ligando TR recluta NCor1 che forma un complesso multiproteico corepressore. Il legame della T3 induce una disattivazione del corepressore e consente il reclutamento di coattivatori (acetil e metiltransferasi) con attivazione del meccanismo transizionale.



AZIONE BIOLOGICA DEGLI ORMONI TIROIDEI

- **Deiodinasi**

L'azione intracellulare degli ormoni tiroidei è regolata dalla quantità locale di T3 disponibile, a sua volta modulata in modo dinamico dagli enzimi deiodinasi



- **Trasportatori di membrana**



Nature Reviews | Endocrinology

AZIONE BIOLOGICA DEGLI ORMONI TIROIDEI

- **Trasportatori intracellulari**

E' dimostrata l'importanza del trasporto attivo degli ormoni tiroidei sulla cellula bersaglio. Questo trasporto avviene grazie a famiglie di neurotrasportatori mo



ALLAN-HERNDON-DUDLEY SYNDROME

AZIONE BIOLOGICA DEGLI ORMONI TIROIDEI

- **Azioni non-genomiche**

L'azione d[illegible] al legame con i loro [illegible] azioni non genomich[illegible] zione con recettori [illegible] etti che si espletano [illegible] attività di trasduzior[illegible]



Nature Reviews | Molecular Cell Biology

Struttura del gene che codifica per la catena beta del TSH e mutazioni riscontrate in pazienti affetti da ipotiroidismo congenito centrale



Ruolo di D2 nel feedback a livello della cellula tireotropa





Copyright ©2003 Elsevier Science (USA). All rights reserved.

Principali fattori che interagiscono nella regolazione di sintesi e secrezione di TSH



stimolazione

inibizione

Disponibilità e trasporto dello iodio

Fonti nutrizionali di apporto dello iodio (µg/24ore)

• Grano	78
• Carne	31
• Vegetali	20
• Desserts	20
• Uova	10
• Alimenti misti	26
Sale iodato	380
Amiodarone (200 mg)	75,000

Intake di iodio
150 µgr non in gravidanza
250 µgr in gravidanza
280 µgr in allattamento
100 µgr bambini

100-150 µg/24ore 500

Gestione della tireopatia da amiodarone



Disponibilità tiroidea di iodio

Elevata

Ipertiroidismo
Patologia tiroidea autoimmune
Carcinoma della tiroide

Bassa

Ipotiroidismo
Ritardo mentale
Gozzo

cinetica dello ioduro I^-

Livelli nel plasma 10 µg/L



Clearance tra 40 e 60 mL/plasma/min : - ipotiroidismo / + ipertiroidismo

Autoregolazione della cellula follicolare



Modificazione del pool iodico da farmaci

Sostanza	Quantità di iodio
Ioduro di potassio (Soluzione Lugol)	127 mcgr iodio/mL – circa 20 gtt
Amiodarone	75 mcgr/200 mg di farmaco
Contrasti iodati	300-480 mcgr iodio/mL
Tintura di iodio	20 mcgr/ml
Tinture per capelli	10 mcgr/gr
Amebicidi	134 mg/200 mg capsule iodoquinolo
Espettoranti	6-25 mcgr/mL
Fave di fuca	6 mcgr/600 mg
Creme per cellulite	720 mcgr/applicazione

hNIS gene





T354P

NIS expression

▲ Grave's Basedow
Adenoma tossico

▼ Noduli follicolari
Carcinomi

Ipertiroidismo iodio-indotto

Fenomeno Jod-Basedow



Disordini da deficit di iodio



Il gozzo multinodulare può essere inizialmente diffuso e poi diventare nodulare

Ormoni tiroidei nella unità fetoplacentare dalla 12ª sett di gravidanza sino alla nascita



Morreale deEscobar G. et al. Best Practice & Research Clin End & Metab 18 (2):225, 2004

Tiroidite autoimmune ed aborto ricorrente







Stagnaro-Green *Thyroid* 2005

Severo deficit di iodio in gravidanza

1. **Cretinismo**



Disabilità intellettuale oltre a difetti neurologici e somatici, disturbi della deambulazione, fenomeni spastici, mixedema

2. **Mortalità neonatale ed infantile**

3. **Difetti neurologici subclinici, riduzione del QI**

Ipotiroidismo

Ipotiroidismo primario : Elevate concentrazioni sieriche di TSH e basse concentrazioni di FT4

Ipotiroidismo secondario e terziario (centrale) : Basse concentrazioni sieriche di TSH e basse concentrazioni di FT4

Patologia Funzionale Tiroidea Subclinica

E' definita da valori di ormoni tiroidei liberi che rimangono nell'ambito dei loro rispettivi range di riferimento in presenza di valori di TSH non normali

Diagnosi differenziale:

1. Sindrome da resistenza a TSH (mutazioni TSHR)
2. Mutazione di recettore per T3
3. Euthyroid sick syndrome
4. TSH elevato per adenoma ipofisario

Cause di ipotiroidismo subclinico

- Tiroidite cronica autoimmune (fattori di rischio: storia familiare di tiroidite cronica autoimmune, storia personale o familiare di patologie autoimmuni, sindrome di Down, sindrome di Turner)
- Persistente incremento dei valori di TSH nella tiroidite subacuta, tiroidite postpartum, tiroidite dolorosa
- Emitiroidectomia, chirurgia del collo, terapia radiometabolica, terapia radiante
- Farmaci : amiodarone, farmaci per contrasto radiologico, litio, citochine – interferonealfa – aminoglutetimide, etionamide, sulfonamidi e sulfaniluree
- Non adeguata terapia per ipotiroidismo clinico : assorbimento del farmaco, interazione con assunzione di ferro, calcio carbonato, dietary soy, fiber, fenitoina, carbamazepina, fenobarbitale)
- Infiltrazioni tiroidee da amiloidosi, sarcoidosi, emocromatosi, tiroidite di Riedel, cistinosi, AIDS, linfoma primitivo della tiroide
- Ipotiroidismo centrale
- Mutazioni del recettore per il TSH



Gozzo tiroideo colloido-cistico “plongeant”

(sezioni coronali)

Tiroidite autoimmune







MANIFESTAZIONI CLINICHE DELL'IPOTIROIDISMO

Manifestazioni cliniche	Note
Cutanee	Riduzione della sudorazione, pallore, differente consistenza di capelli e peli, mixedema, vitiligine, alopecia areata
Oftalmologiche	Edema periorbitale
Ematologiche	Aumentato rischio di emorragie per stato di ipocoagulabilità. Anemia
Cardiovascolari	Diminuzione output cardiaco per riduzione della contrattilità cardiaca. Ipertensione arteriosa. Ipercolesterolemia
Respiratorie	Affaticamento, riduzione del ritmo respiratorio, insufficienza respiratoria
Gatroenterologiche	Diminuzione della motilità e costipazione
Riproduttive	Oligoamenorrea, ipermenorrea
Neurologiche	Encefalopatia, coma mixedematoso
Muscoloscheletriche	Debolezza crampi e mialgia
Metaboliche	Dislipidemia, iponatremia

Nodulo tiroideo

INCIDENZA

Il 4-7% della popolazione adulta presenta un nodulo tiroideo palpabile. 1 su 20 di questi è maligno (2-4 ogni 100.000 persone/anno corrispondenti all'1% di tutti i tumori)



80% noduli colloidi, cisti, tiroiditi

Nodulo clinicamente nascosto

Nodulo clinicamente apparente

6.4%

1.5%

- In differenti studi ecografici il 50% di soggetti negativi all'esame clinico sono affetti da almeno un nodulo della tiroide (*Hegedus L. NEJM 2004*)

- In differenti studi autoptici il 37-57% di soggetti presenta noduli della tiroide (*Rice CO Arch Surg 1932*)

- In pazienti con un singolo nodulo il 20-48% ne presenta altri all'esame ecografico (*TAN GH Ann Intern Med 1984*)

Le principali preoccupazioni del clinico nel rilievo occasionale o evidente di un nodulo tiroideo sono:

1. **Se esso sia o no una neoplasia e nel caso lo fosse se essa sia pericolosa o no per la vita.**

2. **Se esso può provocare disfunzione tiroidea**





Gozzo colloido-cistico



Vascolarizzazione ghiandolare aumentata



Linfoadenopatia reattiva


Giugulari superiori
Spinali anteriori
Giugulari medi
Linfonodi dell'accesso spinale
medi ed inferiori
Giugulari inferiori
Sottomandibolari
Sottomentonieri
Linfonodi del comparto centrale
Prelaringei
Pretracheali
Laterotracheali (ricorrenziali)
Mediastinici anterosuperiori
I
II
III
IV
V
VI

EVIDENZA DI

ECO

TSH plasmatico

normale

FNAC

- **Maligno 5%** — Chirurgia
- **Sospetto 10%** — Chirurgia
- **Benigno 70%** — Follow-up
- **ND 15%** — Follow-up

soppresso

SCINTIGRAFIA

Nodulo Ipercaptante

- **Osservazione ogni 6 mesi**
- **Trattamento ^{131}I**

IMAGING

1

Scintigrafia

I^{123}

I^{131}

Technezio-pertecnetato^{99m}







FNAC
Citologia diagnostica





Nodulo benigno



Tiroidite di Hashimoto



Carcinoma papillifero



Carcinoma anaplastico

➢Tir 1 (THY1)

- **Cellularità inadeguata**
- **Assenza di cellule follicolari**
- **Evidenza di errori nella fissazione del vetrino o nella sua conservazione**

la citoaspirazione eco-guidata viene in questo caso definita non diagnostica per il poco materiale citologico a disposizione. Viene in questo caso entro tre/sei mesi stabilita la possibilità di ripetere la FNAC. Noduli cistici o solidi che ripetutamente portano ad agoaspirato non diagnostico necessitano di una stretta osservazione clinica (ogni tre mesi) o di terapia chirurgica

➢Tir 2 (THY2)

lesione citologicamente benigna, in questo caso non sono necessari ulteriori studi siagnostici. In caso di paziente affetto da gozzo multinodulare necessario non soffermarsi al controllo citologico del nodulo dominante ma, in base alle caratteristiche ultrasonografiche, studiare attentamente tutti i noduli con caratteristiche sospette. Esiste un 5% di possibilità di FNAC falsamente negativo. In caso di aumento del volume del nodulo >20% eseguire una nuova citoaspirazione per ulteriore verifica citologica



Gozzo colloide : ampie cavità follicolari delimitate da tireociti appiattiti, conteneti abbondante colloide – sagome di cristalli di colesterina indicative di pregressa emorragia



Citologia di gozzo nodulare : cellule con alterazioni regressive, gli elementi sono marcatamente dismetrici e polimorfi, prevalentemente fusati, talora plurinucleati . Il rapporto nucleo citoplasma appare conservato

➢Tir 3 (THY3) TIR3 A / TIR3 B

Sospetto citologico di neoplasia follicolare e definisce una analisi del citoaspirato citologicamente indeterminata che, nel sospetto di carcinoma follicolare o neoplasia a cellule di Hurthle deve essere sottoposta a terapia chirurgica per la verifica istologica. Al momento attuale possibile ottenere ulteriori informazioni attraverso esame elastografico. La tecnica dell'elastografia a ultrasuoni aggiunge informazioni nel differenziare i noduli benigni dai maligni con una sensibilità dell'85% e una specificità del 94%. Associata ad altri strumenti diagnostici, l'elastografia è utile nel caso di FNAC Tir3. Al momento attuale l'uso di specifici marcatori molecolari non migliora l'accuratezza diagnostica di una citologia Tir3 anche se la positività alla Galactina 3 decisamente depone per sottoporre il paziente a terapia chirurgica.

Adenoma follicolare, varietà ossifila :

ricca cellularità, oncociti con marcate dismetrie, rare zolle di colloide



➢Tir 4 (THY4)

Sospetto citologico di neoplasia follicolare e definisce una analisi del citoaspirato che è sospetta di carcinoma differenziato della tiroide. L'indirizzo deve essere chirurgico per la conferma



➢Tir 5 (THY5)

Forte sospetto citologico di neoplasia follicolare molto probabile la presenza di carcinoma differenziato della tiroide. L'indirizzo deve essere chirurgico per la conferma



Ipertiroidismo



Ipotiroidismo overt: Basse concentrazioni sieriche di TSH ed elevate concentrazioni di FT4

Ipotiroidismo secondario e terziario (centrale) : Elevate concentrazioni sieriche di TSH e basse concentrazioni di FT4

Tireotossicosi diagnosi differenziale

Morbo di Flajani-Graves-Basedow
Gozzo tossico multinodulare
Adenoma tossico
Patologia trofoblastica
TSH-oma adenoma ipofisario secernente TSH
Tiroidite algica silente
Tiroidite da amiodarone
Tiroidite subacuta di DeQuervain
Tireotossicosi iatrogena
Fase acuta citolitica della tiroidite
Estesa metastasi da carcinoma follicolare tiroideo

- Associata a normale od elevata captazione di radioiodio alla scintigrafia
- Associata a ridotta od assente captazione di radioiodio alla scintigrafia

SINTOMI IPERTIROIDISMO



MANIFESTAZIONI CLINICHE DELL'IPERTIROIDISMO

Manifestazioni cliniche	Note
Cutanee	La cute si presenta più calda (raramente eritematosa). Aumento della sudorazione. Onicolisi. Prurito/man orticarioidi. Capelli più sottili. Possibile alopecia
Oftalmologiche	Iperattività simpatica. *Lid lag* e nistagmo Valutare segni di oftalmopatia basedow
Cardiovascolari	Incremento output cardiaco per incremento della contrattilità cardiaca. Ipertensione sistolica. Cardiomiopatia e possibile fibrillazione atriale
Ematologiche	Aumento numero GR e volume plasmatico : anemia normocromica normocitica. Condizione protrombotica
Metaboliche	Riduzione del colesterolo HDL. Iperglicemia a digiuno
Funzione surrenalica	Diminuzione della CBG diminuite concentrazioni di cortisolo
Respiratorie	Dispnea, dispnea da sforzo. Incremento della produzione di ossigeno (persone asmatiche!)
Gastrointestinali	Incremento del tasso metabolico, incremento della motilità intestinale, diarrea, malassorbimento,iperfagia
Timo	Possibile iperplasia timica

MANIFESTAZIONI CLINICHE DELL'IPERTIROIDISMO

Manifestazioni cliniche	Note
Genitourinarie	Minzione frequente, polidipsia ed ipercalciuria. Elevate concentrazioni di SHBG nelle donne, riduzione dell'estradiolo libero, elevate concentrazioni plasmatiche di LH. Oligomenorrea anovulazione infertilità. Nell'uomo riduzione del T libero DE e DEj
Ossee	Incremento dell'assorbimento osseo, riduzione del volume dell'osso trabecolare (TBS). Elevati livelli di fosfatasi alcalina ed osteocalcina : incremento del turnover osseo. Inibizione della trasformazione del calcidiolo in calcitriolo
Neuropsichiatriche	Variazioni comportamentali ed ansia associate a deficit cognitivi, psicosi, agitazione, depressione alternata a euforia, labilità emotiva, insonnia. Peggioramento di pregressi episodi psichiatrici

Cosa deve rimanere ben impresso